Nobelpreise 1997, 2001 und 2005: Frequenzkämme und Quantengase

Physik am Samstagmorgen, 29. April 2006

Jochen Walz

Institut für Physik

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Der Physik-Nobelpreis 1997

“for development of methods to cool and trap atoms with laser light”

Steven Chu
Stanford University
Stanford, CA, USA
geb. 1948

Claude Cohen-Tannoudji
Collège de France;
École Normale Supérieure
Paris, France
geb. 1933
(in Constantine, Algeria)

William D. Phillips
National Institute of
Standards and Technology
Gaithersburg, MD, USA
geb. 1948

Der Physik-Nobelpreis 2001

“for the achievement of Bose-Einstein condensation
in dilute gases of alkali atoms,
and for early fundamental studies of the properties of the condensates”

Eric A. Cornell
University of Colorado,
JILA Boulder, CO, USA
geb. 1961

Wolfgang Ketterle
Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
Cambridge, MA, USA
geb. 1957

Carl E. Wieman
University of Colorado,
JILA Boulder, CO, USA
geb. 1951

Der Physik-Nobelpreis 2005

“for his contribution
to the quantum
theory of optical
coherence”

Roy J. Glauber
Harvard University
Cambridge, MA, USA
geb. 1925

“for their contributions to the development
of laser-based precision spectroscopy,
including the optical frequency comb
technique”

John L. Hall
University of Colorado,
JILA; National Institute of
Standards and Technology
Boulder, CO, USA
geb. 1934

Theodor W. Hänsch
Max-Planck-Institut für
Quantenoptik Garching;
Ludwig-Maximilians-
Universität Munich,
Germany
geb. 1941

Elektromagnetische Wellen

Elektromagnetische Wellen besitzen ein oszillierendes **elektrisches** und **magnetisches** Feld senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle !

Abbildungen:
Laserlexikon,
Fraunhofer Institut
für Werkstoff- und
Strahltechnik,
Dresden, 2002

Licht

– ein kleiner Teil des elektromagnetischen Spektrums –

Sichtbares Licht
erstreckt sich über
einen Wellenlängen-
bereich von:

400 nm-750 nm

Zerlegung von weißem Licht in Spektralfarben

Vorlesungs-Versuch:

Thermisches Licht einer Bogenlampe wird mit einem Prisma aus Quarzglas in seine Farbanteile zerlegt.

Zu sehen ist ein Spektrum, das sich vom tiefen Rot bis in das Ultraviolett erstreckt.

Absorption von Licht

Vorlesungs-Versuch:

Thermisches Licht einer Bogenlampe wird mit einem Prisma aus Quarzglas in seine Farbanteile zerlegt.

Der obere Teil des Lichtstrahls verläuft in Luft, der untere Teil geht durch eine Flüssigkeit in einer Küvette.

Durch den Vergleich erkennt man den absorbierten Wellenlängenbereich.

Flüssigkeit #1: Fluoreszein-Lösung

Flüssigkeit #2: Kaliumpermanganat-Lösung

Spontane und induzierte Strahlungsprozesse

1917

Albert Einstein

beschreibt die Wechselwirkung von Strahlung und Atom

Er sagt folgende Prozesse voraus:

(induzierte) Absorption

spontane Emission

und induzierte Emission

Schwächt Licht !!

Verstärkt Licht !!

Emissions-Spektrum einer Quecksilberdampf-Lampe

Vorlesungs-Versuch:

In einer Lampe werden Atome in einem Quecksilberdampf durch eine elektrische Gasentladung zum angelegt.

Beim Zerfall von angeregten Zuständen in tieferliegende Zustände wird Licht bei charakteristischen Spektrallinien ausgesandt.

Die Spektrallinien werden durch ein Prisma aus Quarzglas getrennt

Spontane und induzierte Strahlungsprozesse

1917

Albert Einstein

beschreibt die Wechselwirkung von Strahlung und Atom

Er sagt folgende Prozesse voraus:

(induzierte) Absorption

spontane Emission

und induzierte Emission

Schwächt Licht !!

Verstärkt Licht !!

Wie funktioniert ein Laser - Prinzipaufbau eines Lasers

Licht wird zwischen den Spiegeln *hin- und her-reflektiert* und bei jedem Durchgang durch aktives Medium *verstärkt*!

Abstimmbare Laser mit zusätzlichen optischen Elementen

Farbstofflaser

Der Resonator wird durch
Verkippen des Gitters
auf eine Wellenlänge abgestimmt.

Edible Lasers and Other Delights of the 1970s

T.W.H.,
 Optics and Photonics News
 February 2005

[Folie aus Nobel-Lecture von T. W. Hänsch]

Hydrogen Balmer Spectrum

x 15 000

H_{α}
Doppler
profile
(300 K)

saturation
spectrum

T.W. Hänsch, I.S. Shahin,
and A.L. Schawlow,
Nature **235**, 63 (1972)

Laserkühlen

T.W. Hänsch and A.L. Schawlow, *Opt. Comm.* 13, 68 (1975)

Laserkühlung

Bei der Absorption von Photonen aus einem Laserstrahl muß sowohl der **Impuls** als auch die **Energie** erhalten bleiben

Das Atom erfährt einen **gerichteten Impulsübertrag** bei der Absorption eines Photons

Die anschließende **spontane Emission** ist **ungerichtet** und führt im Mittel über viele Absorptions-Emissionszyklen zu **keinem Impulsübertrag**.

Laserkühlung – einige Daten

Maximale Beschleunigung

$$a_{\max} = \frac{\hbar k}{m} \cdot \frac{\Gamma}{2}$$

{C/g/s:⁸⁸Sc

$$a_{\max} = 100000 \text{ m/s}^2$$

Minimale Temperatur

$$T_{\min} \approx 10 \mu\text{K}$$

**10000 fache
Erdbeschleunigung!**

Materiewellen

Bei Photonen ist der Impuls und die Wellenlänge miteinander verknüpft:

$$p = \hbar k = \frac{h}{\lambda}$$

Auch für Materie kann eine solche Beziehung aufgestellt werden:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v}$$

Louis-Victor de Broglie
Nobelpreis 1929

Die Schrödingergleichung

Wellengleichung für Materiewellen im freien Raum

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi(\vec{r}, t)$$

Einfache Lösung für Objekt mit Impuls p

$$\Psi(x, t) = e^{i(\omega t - kx)} = e^{i/\hbar(Et - px)}$$

$$|\Psi(x, t)|^2 = 1$$

Dispersionsrelation für **Materie** und **Photonen** unterschiedlich !

$$E = \hbar\omega(k) = \frac{\hbar^2}{2m} \cdot k^2$$

$$\hbar\omega(k) = \hbar c \cdot k$$

$$v_p = \frac{1}{2} \frac{p}{m} = \frac{1}{2} v$$

$$v_p = c$$

deBroglie Wellenlängen verschiedener Objekte

Objekt	m (kg)	v (m/s)	λ (mm)
Elektron	$9,1 \cdot 10^{-31}$	$2 \cdot 10^6$	$4 \cdot 10^{-7}$ (0,00000004)
Neutron	$1,7 \cdot 10^{-27}$	$4 \cdot 10^3$	$9 \cdot 10^{-8}$ (0,00000009)
^{87}Rb Atom	$1,5 \cdot 10^{-25}$	270	$2 \cdot 10^{-8}$ (0,00000002)
C_{60}	$1,2 \cdot 10^{-24}$	210	$3 \cdot 10^{-9}$ (0,000000003)
Fussball	0,5	20	$7 \cdot 10^{-32}$ (0,0000000000000000 0000000000000000 007)

Interferenz am Doppelspalt

Klassische Teilchen

Wellen

Was interferiert bei Materiewellen ?

Elektromagnetische Felder

$$E_{det} = E_1 + E_2$$

$$I \propto |E_1 + E_2|^2$$

Quantenmechanische Wellenfunktionen

$$\Psi_{det} = \Psi_1 + \Psi_2$$

$$n \propto |\Psi_1 + \Psi_2|^2$$

Interferenz von C_{60} Materiewellen

Pressure $\sim 5 \cdot 10^{-7}$ mbar

C_{60} Parameter

$v = 220\text{ m/s}$

$\lambda = 2,5\text{ pm}$

Gitter

Spaltbreite: 50 nm

Spaltabstand: 100 nm

M. Arndt *et al.*

Nature **401**, ff. 680, 1999

<http://www.quantum.univie.ac.at/>

de Broglie Wellenlänge

Thermische deBroglie Wellenlänge

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

273 K (0°C)
Wasser gefriert

77K (-197°C)
Luft wird flüssig

4K (-269°C)
Helium wird flüssig

T (K)

10000

100

10⁻¹

10⁻⁴

10⁻⁶

10⁻⁸

deBroglie Wellenlänge
eines typischen Atoms

0.01 nm

0.1 nm

1 nm

0.01 μm

0.1 μm

1 μm

10 μm

**Hier müssen wir hin, um Wellencharakter
auf einer makroskopischen Skala zu sehen !**

Materie verwandelt sich bei tiefen Temperaturen!

- **Kältere Atome und Moleküle sind langsamer** und erzeugen daher einen **geringeren Druck** in einem Gefäß!
- **Materie kann einen Phasenübergang bei Temperaturabsenkung erfahren!**
 - **Flüssigkeit** → **Festkörper**
 - **Gas** → **Flüssigkeit**
 - **Normalleiter** → **Supraleiter**
 - **Normale Flüssigkeit** → **Superflüssigkeit**
 - **Klassisches Gas** → **Quantengas (Bose-Einstein-Kondensat)**

Bosonen und Fermionen

In der Quantenmechanik unterscheidet man Teilchen nach ihrem **Drehimpuls**, der ein Maß dafür ist wie schnell sich das Teilchen um sich selbst dreht.

Dieser Drehimpuls kann aufgrund der Quantenmechanik keine kontinuierlichen Werte annehmen, sondern tritt immer nur in **ganz- oder halbzahligen Einheiten des Planck'schen Wirkungsquantums h** auf.

Teilchen deren Drehimpuls ein ganzzahliges Vielfaches von h ist bezeichnet man als Bosonen. Ist er ein halbzahlig Vielfaches von h so bezeichnet man sie als Fermionen.

Der Drehimpuls L bestimmt, ob Teilchen Bosonen oder Fermionen sind.

Bosonen

$$L = n h$$

Fermionen

$$L = (n+1/2) h$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

Bosonische Liebe – Fermionisches Einzelleben

Besetzung von Quantenzuständen im Falle von

Bosonen

Je mehr Bosonen einen Zustand besetzt haben, desto mehr möchten in diesen Zustand gelangen.

Fermionen

**Fermionen sind *Einzelgänger* !
Zwei Fermionen nehmen nie den gleichen Quantenzustand ein (*Pauliverbot*).**

What is Bose-Einstein condensation (BEC)?

High Temperature T:
thermal velocity v
density d^{-3}
"Billiard balls"

Low Temperature T:
De Broglie wavelength
 $\lambda_{dB} = h/mv \propto T^{-1/2}$
"Wave packets"

$T = T_{crit}$:
Bose-Einstein
Condensation
 $\lambda_{dB} \approx d$
"Matter wave overlap"

$T = 0$:
Pure Bose
condensate
"Giant matter wave"

Vom klassischen Gas zum Bose-Einstein-Kondensat

Der Weg zur Bose-Einstein-Kondensation

$$n \cdot \lambda^3 \approx 1$$

Magnetische Fallen für Neutralatome

Energie eines Atoms
in einem externen Magnetfeld $E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

Kraft auf ein Atom in einem
inhomogenen Magnetfeld $\vec{F} = -\mu \cdot \nabla B$

Verdampfungskühlung

Verdampfe Atome, die mehr als die mittlere Energie des Systems besitzen.

Warte bis sich ein neues thermisches Gleichgewicht durch Stöße bei einer niedrigeren Temperatur eingestellt hat.

Verdampfungskühlen

Tom Greytak

Daniel Kleppner

Plus eine Menge Optik und Elektronik (Tisch 1) !!

[Folie von I. Bloch]

Anzeige mit Glückwunsch im Oktober 2001

**Wir meinen: Aufräumen!
Stockholm meint: Nobelpreis!**

■ Egal, Lieber Wolfgang Ketterle, wir gratulieren herzlich zur Erzeugung der Bose-Einstein-Kondensation in verdünnten Gasen aus Alkaliatomen.

Baden-Württemberg
Wir können alles. Außer Hochdeutsch.

**Wir meinen: Aufräumen!
Stockholm meint: Nobelpreis!**

Egal. Lieber Wolfgang Ketterle, wir gratulieren herzlich zur Erzeugung der Bose-Einstein-Kondensation in verdünnten Gasen aus Alkaliatomen.

Baden-Württemberg
Wir können alles. Außer Hochdeutsch.

BEC @ JILA, June '95
(Rubidium)

BEC @ MIT, Sept. '95
(Sodium)

Interferenz am Doppelspalt

Klassische Teilchen

Wellen

Interferenz zweier Bose-Einstein-Kondensate

**Gefangene
BEC's**

**BEC's nach einer
Expansionszeit t**

$$\lambda = \frac{h}{m\Delta v} = \frac{ht}{md}$$

M. R. Andrews *et. al.*
Science 275, ff. 637, 1997

Atom laser gallery

Height:
5, 2, 0.5, 1 mm

MIT '97

Munich '99

Yale '98

NIST '99

[Folie von I. Bloch]

Rotating Fluids

Normal

Quantum

Fluid

"Matter waves"

$$\lambda = \frac{h}{mv} \quad \text{de Broglie relation}$$

$$2\pi r = n \lambda = \frac{n h}{mv}$$

$$\Rightarrow v \cdot 2\pi r = \oint \vec{v} \cdot d\vec{s} = n \frac{h}{m}$$

Quantization: Integer number of matter waves on a circle

Magnification by ballistic expansion (x 20)

J. Abo-Shaeer, C. Raman, J.M. Vogels, W.Ketterle, Science, 4/20/2001

[Folie von W. Ketterle]

Die Messung optischer Frequenzen und Frequenzkämme

Die Wellenlänge eines Laserstrahls kann mit
Interferometern gemessen werden.

Die Genauigkeit einer solchen *Längenmessung* ist aber begrenzt.
→ enorme Genauigkeitssteigerung durch *Frequenzmessungen*.

A Laser Wavemeter Using a Toy Train

H.R. Xia, S.V. Benson and T.W. Hänsch, *Laser Focus* 17, 54 (1981)

Hydrogen 1S-2S two-photon transition

(natural line width: 1.3 Hz)

T.W. Hänsch, S.A. Lee, R. Wallenstein, and C. Wieman, Phys. Rev. Lett. **34**, 307 (1975), ...

[Folie aus Nobel-Lecture von T. W. Hänsch]

Optical Spectroscopy of Hydrogen

Hydrogen 1S-2S resonance

A dream... (Ali Javan, 1963)

Extend microwave frequency counting techniques into the optical region.

Frequency spectrum in optical frequency synthesis

FIG. 1. PTB's frequency chain to the Ca intercombination line (PLL = phase locked loop, details are given in the text).

Garching frequency interval divider chain (1997)

[Folie aus Nobel-Lecture von T. W. Hänsch]

Spektrum eines Pulszugs

Das Spektrum eines Zugs aus Nadelimpulsen mit dem zeitlichem Abstand τ ist ein Frequenzkamm mit einem „Zinken-Abstand“ von $1/\tau$.

Number of components:

9

Duty Cycle:

0.05

$$f_m = m f_{\text{rep}} + f_{\text{offset}}$$

Optical Frequency Comb

Phase-Controlled 10 fs Laser

Orthogonalizing control degrees of freedom

Output Coupler & Translating Piezo
(Mode Position)

Prism Pair

Pump

Ti:Sapphire
Gain

β

High Reflector
& Tilting Piezo
(Mode Spacing)

Laser: Kapteyn, Murnane, Cundiff
Control Ideas: Udem et. al., Hall, Ye

Th. Udem, et al, PRL **82**, 3568 (1999).

carrier-envelope phase slips and offset frequency

J.N. Eckstein, *Ph.D. Thesis*, Stanford University, 1978

Time Domain ↔ Frequency Domain

• Frequency modes of the fs pulse are offset from $f_{n=0}=0$ by δ

$$2\pi\delta = \Delta\phi f_{\text{rep}}$$

Seriously- nonlinear optics (O(20))

R. Windeler

J.K Ranka, R. S. Windeler, A. Stenz, Opt. Lett. 25, 25 (Jan. 2000)

Microstructured fiber

- dispersion zero at ~800 nm
- pulses do not spread
- continuum generation via self-phase modulation

Optical Frequency Comb Synthesizer

[Folie aus Nobel-Lecture von T. W. Hänsch]

Octave-spanning frequency combs

„Rainbow Fiber“

(Lucent Technologies, 1999)

“Photonic Crystal Fiber”

J.C. Knight, W.J. Wadsworth, P. St. Russell
University of Bath, UK

Self-referencing frequency comb

R. Holzwarth et al.,
Phys. Rev. Lett **85**, 2264 (2000)

D. Jones et al.,
Science **288**, 635 (2000)

T.W. Hänsch,
Witnessed disclosure
(March 30, 1997)

Self-referenced Optical Frequency Synthesizer

δ can be set at any fixed frequency:
For example, $\delta = 0$: $f_n = n \Delta$

Telle, Appl Phys B '99
Jones, Science '00

Absolute control of carrier-pulse phase: extreme nonlinear optics,
precision optical waveforms

Single-Laser Optical Frequency Comb Synthesizer

measuring the frequency of hydrogen with a laser comb

2003: Hydrogen 1S-2S spectrometer

Hydrogen spectrometer, February 2003

[Folie aus Nobel-Lecture von T. W. Hänsch]

PHARAO transportable cesium fountain clock

[Folie aus Nobel-Lecture von T. W. Hänsch]

Frequency comb synthesizer

[Folie aus Nobel-Lecture von T. W. Hänsch]

Hydrogen 1S-2S frequency

(F=1 to F'=1 hyperfine component)

Feb. 2003: $f(1S-2S) = (2\,466\,061\,102\,474\,851 \pm 34)$ Hz

relative uncertainty: 1.4×10^{-14}

June 1999: $f(1S-2S) = (2\,466\,061\,102\,474\,870 \pm 46)$ Hz

relative uncertainty: 1.9×10^{-14}

A difference of (-29 ± 57) Hz in 44 months equals a relative drift of the 1S-2S transition frequency of

$(3.2 \pm 6.3) \times 10^{-15}$ per year

$$\dot{\alpha}/\alpha = (-0.3 \pm 2.0) \times 10^{-15} yr^{-1}$$

$$\dot{c}_s/\mu_{C_s} = (2.4 \pm 6.8) \times 10^{-15} yr^{-1}$$

Zusammenfassung

Frequenzkämme und Quantengase:

Wechselwirkung zwischen Licht und Materie

Wie funktioniert ein Laser?

Wie können Atome mit Laserlicht gekühlt werden?

Welche Quanten-Eigenschaften haben ultrakalte Atomwolken?

Wie können optische Frequenzen gezählt werden?