Analyse der Grobfraktion (Pflanzenreste und Flugsandkörner)

Die Sedimente der Maare und Trockenmaare der Eifel enthalten in der Grobfraktion > 63 µm Pflanzenreste (Holz, Zweige, Stengelfasern, Blätter, Samen und Früchte) und mineralische Partikel aus dem Eintrag der in ein Maar fließenden Bäche und Gerinne. Diese Partikel sind in diskreten Hochwasserlagen mm-cm Mächtigkeit in großen Mengen zu finden, z.B. in der Hochwasserlage des Jahres 1342 in Schalkenmehren (Herbig & Sirocko, 2012). Für das Einzugsgebiet dieses Maarsees lässt sich die Landwirtschaft des Mittelalters mit Roggen und Lein, aber auch 50 verschiedenen Ackerunkräutern rekonstruieren (LEZ1). Pflanzenreste aus dem frühen Holozän sind dagegen nur spärlich vertreten, da die menschengemachte Erosion fehlte, so dass sich nur wenige Reste der Bäume des frühholozänen Waldes finden (LEZ 2). In der Späteiszeit dominieren die Birkensamen, aber auch Oogonien von Laichkräutern sind häufig (LEZ 3). Das letzte Eiszeitmaximum zeigt dagegen nur Reste von Moosen, aber wiederum Laichkräuter und Ostrakoden. Die Ablagerungen der vorausgegangenen Tundrenzeit (LEZ4) kennzeichnen Moose und Samen von Wasserhahnenfußgewächsen (Ranunculaceae) und insbesondere Sporen von Schlauchpilzen (Coenococcum). Die Steppenvegetation der LEZ 5 ist durch Gräser und Offenlandpflanzen charakterisiert. Birkensamen und Holzkohle sind am häufigsten in der Zeit des borealen Waldes der LEZ7. Fichtennadeln haben ihr Maximum in der Zeit der LEZ8/9 in der nicht nur Nadelbäume, sondern auch viele andere Laubbäume in der Eifelvegetation vertreten waren. Diese Vegetationsentwicklung der letzten 60 000 Jahre wird schon in Fotos der Grobfraktion der Maarsedimente deutlich. Holzreste zeigen sich häufig im Holozän (LEZ 1, 2) und im Frühglazial (LEZ 8, 9). Die eiszeitlichen Sedimente (LEZ 4,5) enthalten dagegen gut gerundete Körner von Flugsand, welcher ermöglicht, die starken Winde dieser Zeit mit ihren Windrichtungen zu rekonstruieren.

LEZ 1: 0 - 6000 BP Anthropogener Wald/Landwirtschaft

LEZ 2: 6000 - 10 500 BP Natürlicher Laubwald

LEZ 3: 10 500 - 14 700 BP Borealer Wald/Flutlagen/Flugsand

LEZ 4: 14 700 - 23 000 BP Polarwüste/Loess

LEZ 5: 23 000 - 28 500 BP Tundra/Flutlagen/Flugsand

LEZ 6: 28 500 - 36 500 BP Steppe/Vulkanaktivität

LEZ 7: 36 500 - 49 000 BP Borealer Wald/Flutlagen

LEZ 8/9: 49 000 - 60 000 BP Fichtenwald